


NEVO DI SUTTON o ALONEVO...



Digestione del nevo

Nevo di sutton o leucoderma centrifugo acquisito

- Lesione benigna costituita da un nevo, circondato da un anello depigmentato
- Fisiopatologia: melanociti riconosciuti come anomali e attaccati dal sistema immunitario
- Tipicamente durante l'adolescenza
- può associarsi a vitiligine, poliosi, anemia perniziosa.
- Elettivamente al dorso
- Nel 50% scomparsa completa
- Può essere singolo o multiplo (25%)

Da trascurare perché sempre benigno



Granuloma annulare...

placche cutanee, ben delimitate, configurazione tondeggianti, centro più chiaro e bordo esterno congesto. Bordo con piccole papule cupoliformi, contigue, colore della cute o rosee o violacee.

Al centro delle lesioni l'epidermide è liscia, leggermente iperpigmentata e un po' depressa, ma senza altre alterazioni.



■
non solo al piede...

"Granuloma Annulare
sottocutaneo"


o

"nodulo pseudoreumatoide
dell'infanzia"



nodulini duri, singoli o multipli, localizzati profondamente nel sottocutaneo a livello dello scalpo, della fronte, delle zone periorbitarie, degli arti e delle natiche; simili a quelli dell'artrite reumatoide ma più piccoli e non sono associati a sintomi articolari.

GRANULOMA ANULARE
(Nodulo reumatico)



- *vasculite con danno ed occlusione di arteriole del derma e degenerazione del collagene.*
- *istiociti che si dispongono attorno al connettivo danneggiato come in una reazione da corpo estraneo..*

Bambini di età < 10 anni

Nodulo che compare improvvisamente e si accresce rapidamente (1-5 cm)

Bordo ad anello con papule roseo-rosso-brune

Superficie anteriore degli arti (dita, mani, piedi, caviglie, nuca)

60% lesioni multiple

Focolai di necrosi del collagene del derma profondo circondati da infiltrato istiocitario "a palizzata"


Nessuna terapia, regredisce spontaneamente

Lichen Striato



- bambino di 2 anni
- da circa 3 mesi eruzione cutanea a decorso lineare lungo l'arto superiore dx
- NON PRURITO
- inizialmente papule eritematose-rilevate, poi rosate

www.med-ars.it
using by permission



Blaschko's lines

banda lineare: arti, tronco e volto (lungo le linee di Blaschko), papulare
poi ipopigmentata, lunga vari centimetri (anche un intero arto),
prurito scarso o assente



AUTORISOLUTIVO ma può durare tanto (2-3 sett. e l'anno).
Terapia: **NULLA!** Rassicurazione dei genitori!




Assottigliamento e fissurazioni longitudinali della lamina
interessamento di metà unghia (emilamina)

Lichen planus



Bambina 10 anni, da qualche mese: papule di 3-6 mm violacee, al dorso e al torace, molto pruriginose.



nus

Reticolo di Wickham

co

:

- Sedi tipiche: arti, polsi, avambracci, caviglie, anche le mucose (orale)
- Diagnosi: clinica e istologica (acantosi, corpi di Civatte da apoptosi)
- Terapia con steroidi (topici), tacrolimo topico



LICHEN SCLEROATROFICO



prurito, bruciore
(sanguinamento
legato al
grattamento),
comparsa di alone
atrofico biancastro
perivulvare
(forma ad 8) e
progressivo
appiattimento
delle grandi labbra.



Pensaci se...
***fimosi
acquisita !***
banderella
costrittiva
biancastra,
restringimento
meato uretrale



VITILIGINE



***LICHEN
SCLERO-
ATROFICO***

Lichen scleroatrofico extragenitale



Placche extragenitali al tronco e agli arti,
atrofiche e ipopigmentate