

L.G. nato da parto cesareo alla 36° settimana di età gestazionale. Peso 2650 grammi. Apgar 8-9.

Le ecografie prenatali avevano evidenziato la presenza di una massa di 5 mm di diametro in sede latero-cervicale a partire dalla 10° settimana di gestazione.

Ai controlli successivi il diametro della massa aumentava progressivamente fino alle dimensioni di 5 cm alla nascita.

Una ecografia confermava la presenza di un...

IGROMA CISTICO

L'igroma cistico è il risultato di un anomalo sviluppo embrionario del sistema linfatico, e può essere considerato una forma particolare di linfangioma.

La sede principale è la regione latero-cervicale con prevalente localizzazione al di sotto del muscolo sternocleidomastoideo.

Sedi meno frequenti sono quella inguinale, ascellare e mediastinica.

Esistono due tipi anatomopatologici di igroma: settato e non settato.

La forma settata, a differenza di quella non settata, si associa a prognosi peggiore e a malformazioni oltre che ad anomalie cromosomiche, tra cui la più frequente è la sindrome di Turner.

Il parto cesareo è indicato per evitare la rottura dell'igroma.

Il trattamento chirurgico è complesso e spesso non risolutivo per l'impossibilità di una rimozione completa.

Bibliografia

Chappuis JP. Current aspects of cystic lymphangioma in the neck. Arch Pediatr 1994;1(2):186.

UNA PATOLOGIA RARA MA NON TROPPO

MICHELE PORRELLO

Azienda Ospedaliera OCR, Sciacca (Agrigento)



CONFRONTI IN PEDIATRIA 2003

Costi e benefici in Pediatria: analisi delle evidenze oltre il "p" statistico

Trieste, 5-6 dicembre 2003

Venerdì 5 dicembre

SESSIONE PLENARIA - modera F. Panizon

Introduzione al tema - L. Greco

Leukotrieni nell'asma - G. Longo; commenta A. Boner

I bilanci di salute - D. Baronciani; commenta G. Tamburlini

SESSIONI PARALLELE

Aciclovir e varicella - P.A. Macchia

commenta F. Marchetti, modera M. Fontana

Vaccinazione Hib, Varicella, Rotavirus - A. Tozzi

commenta G. Bartolozzi, modera B. Assael

Plantare e piede piatto - G. Tagliavoro

commenta G. Maranzana, modera G. Longo

SESSIONE PLENARIA - modera G. Maggiore

Il cortisone nella Kawasaki e nella meningite - F. Marchetti

commenta M. Fontana

Latti HA, Anti RGE e ferro nelle formule - M. Fontana; commenta A. Ventura

PH metria e RGE - S. Martelossi; commenta A. Barabino

SESSIONI PARALLELE

Macrolidi e bronchiti asmatiche - B. Assael

commenta F. De Benedictis, modera G. Longo

Antinfiammatori COX2 - L. Lepore

commenta F. Falcini, modera G. Bartolozzi

Il GH nel difetto di crescita costituzionale - G. Tonini

commenta F. Chiarelli, modera A. Ventura

Sabato 6 dicembre

SESSIONE PLENARIA - modera P.A. Macchia

La profilassi dell'acaro - A. Boner, commenta G. Longo

Medicine alternative - F. Panizon, commenta F. Macri

I farmaci per la tosse - D. Faraguna, commenta B. Assael

SESSIONI PARALLELE

La dieta nell'orticaria - A. Ventura; commenta M. Cutrone, modera L. Greco

L'antistaminico nell'eczema - F. Arcangeli

commenta G. Longo, modera P.A. Macchia

Adrenalina e Bronchiolite - F. De Benedictis

commenta E. Barbi, modera F. Panizon

Segreteria scientifica: Giorgio Longo, Alessandro Ventura; Clinica Pediatrica, IRCCS "Burlo Garofolo"; via dell'Istria, 65/1 - 34137 Trieste
• Tel. 040 3785233

Segreteria organizzativa: Quickline s.a.s., via S. Caterina da Siena, 3
- 34122 Trieste; Tel. 040 363586 Fax 040 7606590
cell. 333 5223519 e-mail: info@quickline.it