

LE AZIENDE INFORMANO

Sediflù bambini

Sciroppo

UN SOLLIEVO NATURALE
PER LA TOSSE DEL BAMBINO

Senza conservanti,
alcol, glutine e lattosio

Sediflù bambini è uno sciroppo senza conservanti con il gusto di amarena che, grazie all'azione espettorante della Piantaggine lanceolata, all'azione mucolitica dell'Edera e all'effetto fluidificante della Drosera, è indicato nel trattamento sintomatico sia della tosse secca che della tosse grassa.

- Fluidifica e stimola l'espulsione del catarro.
- Favorisce efficacemente la riduzione dello stimolo tussigeno.
- Utile in caso di tosse psicogena.

L'azione dello sciroppo è completa e arricchita dalla presenza del miele di Eucalipto con attività emolliente e lenitiva. Miele di origine italiana.

Modalità d'uso

Bambini fino a 4 anni:
5 ml 2 volte al giorno

Bambini oltre i 4 anni:
10 ml 2 volte al giorno



Flacone da 150 ml
SOLO IN FARMACIA

Sakura Italia Srl
www.sakuraitalia.it

Quiz di autovalutazione

La lettura di una Rivista medica è apprendimento attivo o passivo? Può essere l'uno o l'altro. PQRST è una ricetta per una lettura attiva. P STA PER PREVIEW (prelettura veloce, uno sguardo d'insieme al testo). Q STA PER QUESTION (cosa so già? cosa vorrei sapere?). R STA PER READ (lettura attenta). S STA PER STATE (bilancio delle conoscenze DOPO la lettura). T STA PER TEST (controllo, quiz). Vi proponiamo di testarvi con questi quiz PRIMA E DOPO. Se rispondete a 10 (70%), siete bravi; se rispondete a tutti, vuol dire che i quiz sono troppo facili, almeno per voi; se, a meno di 7 (50%), sono troppo difficili. Oppure dovete rimettere in discussione le vostre conoscenze.

PAGINA GIALLA

1. In una neonato a termine con vomito biliare una causa chirurgica può riguardare circa il 50% dei casi

Vero/Falso

2. L'introduzione tardiva del glutine all'età di 12 mesi rispetto a un'introduzione all'età di 6 mesi nei bambini con rischio genetico di celiachia (parente affetto, HLA predisponente) è in grado di ridurre la percentuale di positività per gli anticorpi anti-transglutaminasi

Vero/Falso

LETTERE - CODEINA E DOLORE

3. Nella popolazione caucasica quale risulta essere la percentuale di casi "iper-responders" che trasformano una grande quota della codeina in morfina?

a) 6%; b) 10%; c) 20%; d) 25%.

NEWS BOX

MALATTIA DA VIRUS EBOLA E BAMBINI

4. Il virus Ebola è stato scoperto per la prima volta nel:

a) 1976; b) 1986; c) 1996; d) 2006.

5. Nella attuale epidemia da virus Ebola i bambini e gli adolescenti rappresentano una piccola percentuale di casi

Vero/Falso

LINEE GUIDA

ACCESSO ASMATICO ACUTO

6. Nello schema classificativo di un accesso asmatico acuto (AAA) si tiene conto della frequenza respiratoria e di quella cardiaca a seconda dell'età. In un bambino tra 6 e 9 anni quale è il valore di frequenza respiratoria ritenuto nella norma?

a) <20 atti/min; b) <30/min; c) <40/min.

7. Nella gestione dell'AAA moderato non è sempre previsto l'uso dello steroide

Vero/Falso

8. L'uso del salbutamolo spray o aerosol è gravato di frequenti effetti collaterali e quindi nell'AAA andrebbe sempre utilizzato con un calcolo preciso della dose e mantenendo degli intervalli ben distanziati tra una somministrazione e l'altra

Vero/Falso

9. La sospensione dello steroide per via orale nell'AAA andrebbe fatta:

a) Anche bruscamente senza scalare la dose; b) È sempre consigliabile uno scalo gra-

duale della dose; c) Dipende dalla dose utilizzata inizialmente.

10. Quale delle seguenti affermazioni è errata?

a) L'uso degli steroidi per via endovenosa è di norma preferibile nei casi più gravi; b) Nell'AAA con SpO₂ <92% è sempre raccomandata l'ossigenoterapia di supporto; c) Il ricovero in terapia intensiva va pensato nei casi in cui la PaCO₂ >48 mmHg con ipossipemia persistente (<60 mmHg); d) L'ipratropio bromuro deve essere sempre utilizzato, anche nei casi di AAA di grado moderato che rispondono alle prime dosi di salbutamolo.

PROBLEMI SPECIALI - TIMO ECTOPICO

11. Quale delle seguenti è la sede più tipica del timo ectopico?

a) Area cervicale/mediastino; b) Ili polmonari/pericardio; c) Parete toracica/ascella; d) Spazio retrofaringeo.

12. Il riscontro di un timo ectopico richiede sempre l'asportazione chirurgica

Vero/Falso

RICERCA - PLAGIOCEFALIA POSTURALE

13. La plagiocefalia occipitale posturale è una condizione benigna che:

a) Dopo i sei mesi migliora spontaneamente e arriva alla risoluzione spontanea nella stragrande maggioranza dei casi entro i 5 anni; b) In circa il 20% dei casi lascia degli esiti permanenti; c) Gli esiti dipendono fortemente dalle misure di riabilitazione che sono messe in atto precocemente.

14. Quali sono i fattori di predisposizione dello sviluppo di plagiocefalia occipitale posturale da osservare a 1 e 3 mesi di vita?

a) Rotazione preferenziale da un lato; b) Asimmetria cranio-facciale iniziale; c) Pieghe più profonde e più arrossate dalla parte della flessione laterale del collo; d) Tutte le precedenti; e) Tutte le precedenti tranne una.

CASI INDIMENTICABILI

NEFRITE FOCALE ACUTA

15. La nefrite focale acuta si caratterizza per la presenza, nel 100% dei casi, di batteriuria e piuria

Vero/Falso

16. Nella nefrite focale la terapia antibiotica deve essere eseguita inizialmente e per lungo tempo per via endovenosa

Vero/Falso

Risposte

PAGINA GIALLA 1=Vero; 2=Falso; LETTERE 3=a; NEWS BOX 4=a; 5=Vero; LINEE GUIDA 6=b; 7=Falso; 8=Falso; 9=a; 10=d; PROBLEMI SPECIALI 11=a; 12=Falso; RICERCA 13=a; 14=d; CASI INDIMENTICABILI 15=Falso; 16=Vero.