

LE AZIENDE INFORMANO

LOVENEST

Il cuscino anatomico ed ergonomico primi mesi, creato e brevettato per una corretta posizione della porzione cervicale del rachide del neonato. Il cuscino è adatto per tutti i bambini perché sostiene in modo equilibrato e sicuro, permettendo libertà di movimento durante il sonno. Aiuta contro la plagiocefalia e la brachicefalia.

Lovenest è stato studiato per permettere al bambino di riposare e di dormire nella maniera più idonea.

È nato dalle indicazioni dell'American Academy of Pediatrics sul posizionamento supino per evitare la sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS).

In caso di posizione prona, durante il sonno del bambino, i materiali in cui è realizzato il cuscino Lovenest permettono una ventilazione adeguata.

Il cuscino Lovenest non ha la pretesa di curare le patologie sopraindicate, ma si propone di creare esclusivamente le condizioni migliori di appoggio del rachide e della testa del neonato.

La particolare forma anatomica ed ergonomica del cuscino può ridurre il rischio di deformazioni del capo dovute a un appoggio prolungato in posizione supina, cranio piatto o peggioramenti del torcicollo muscolare congenito. Inoltre permette al neonato l'assunzione di qualsiasi posizione sempre nelle condizioni di appoggio idoneo e senza timore di impedirne la respirazione in caso di posizione prona, essendo realizzato con materiali che consentono adeguata ventilazione.

Qualora il bambino manifestasse a pochi giorni dalla nascita malformazioni della volta cranica, oltre all'uso di Lovenest, è opportuno che il neonato segua un percorso medico e riabilitativo volto a migliorare le articolazioni intracraniche.

Quiz di autovalutazione

La lettura di una Rivista medica è apprendimento attivo o passivo? Può essere l'uno o l'altro. PQRST è una ricetta per una lettura attiva. P STA PER PREVIEW (prelettura veloce, uno sguardo d'insieme al testo). Q STA PER QUESTION (cosa so già? cosa vorrei sapere?). R STA PER READ (lettura attenta). S STA PER STATE (bilancio delle conoscenze DOPO la lettura). T STA PER TEST (controllo, quiz). Vi proponiamo di testarvi con questi quiz PRIMA E DOPO. Se rispondete a 11 (70%), siete bravi; se rispondete a tutti, vuol dire che i quiz sono troppo facili, almeno per voi; se, a meno di 8 (50%), sono troppo difficili. Oppure voi dovete rimettere in discussione le vostre conoscenze.

PAGINA GIALLA

1. La fleboclisi di scelta nella gastroenterite acuta con disidratazione è:

a) Sempre la soluzione fisiologica; b) Sempre la soluzione "mista" (glucosata, iposalina); c) L'una o l'altra a seconda dello ionogramma; d) L'una o l'altra a seconda dello ionogramma, ma eventualmente anche la semplice glucosata se esiste una iponatremia severa.

2. Nella malattia di Crohn esiste l'evidenza:

a) Di un difetto della risposta flogistica primaria; b) Di un eccesso della risposta immunologica secondaria; c) Entrambe le evidenze sono presenti.

3. La vaccinazione antipneumococcica con vaccino coniugato, rinforzata da un richiamo con vaccino 23-valente non coniugato, riduce la probabilità di ricadute infettive nei bambini con OME

Vero/Falso

LETTERE

4. Il numero dei casi di infezione streptococcica da trattare (NNT) per prevenire un caso di malattia reumatica è rimasto sempre lo stesso, prima e dopo il 1960

Vero/Falso

5. La concordanza del disturbo autistico nei gemelli omozigoti è:

a) Eguale al 100%; b) Inferiore al 50%; c) Significativamente inferiore al 100% previsto.

FIBROSI CISTICA

6. Quale di queste affermazioni è SCORRETTA?

a) L'insufficienza pancreatica è presente solo nel 60% dei neonati con FC; b) L'insufficienza pancreatica è presente nel 90% di soggetti di 12 anni; c) La pancreatite ricorrente è un'evenienza comune; d) Il GER è più comune della pancreatite.

7. Quale di queste affermazioni è SCORRETTA?

a) La colelitiasi sintomatica ha una frequenza maggiore nei soggetti con FC che nella popolazione generale; b) L'ostruzione intestinale distale è un evento frequente; c) La cirrosi epatica complica la fibrosi cistica in circa un quarto dei casi; d) Una osteopenia al di sotto dei 40 anni fa parte dei riscontri tipici della FC.

8. L'impatto fecale del paziente con FC può essere curato a domicilio:

a) Con Flumucil + olio di vaselina per os; b) Con polietilenglicole 10-15 ml/kg ripetuto nella giornata; c) Con polietilenglicole per sondino nasogastrico in infusione continua; d) Con tutti e tre questi protocolli, in funzione della gravità; e) Nessuno di questi protocolli dà garanzie sufficienti ed è meglio ospedalizzare quanto prima il bambino, non essendo escludibile la necessità di un intervento chirurgico.

9. Una valutazione dello stato nutrizionale dei soggetti con FC considera piuttosto:

a) Il rapporto peso per statura; b) Il rapporto peso per età.

FITOTERAPIA

10. Quale di queste affermazioni NON corrisponde a verità? Gli RCT sulla popolazione generale confermano l'efficacia:

a) Di propoli sulle infezioni ricorrenti; b) Di psillio come lassativo e blando ipocolesterolemizzante; c) Di valeriana sull'insonnia; d) Tutte queste affermazioni sono scorrette.

11. Quale di queste affermazioni NON corrisponde a verità? Gli RCT sulla popolazione generale dimostrano l'efficacia:

a) Di finocchio sulla dismenorrea; b) Di echinacea sulle infezioni ricorrenti; c) Di malaleuca come antifungino locale; d) Nessuna di queste affermazioni corrisponde a verità.

ABC

12. La sindrome delle infezioni respiratorie ricorrenti (RRIs) riguarda:

a) Circa il 5% dei bambini sotto i 5 anni; b) Il 10%; c) il 15%.

13. Le RRI sono da attribuire:

a) Alla frequenza in asilo-nido e alla scuola materna; b) A un imprecisato difetto di difesa; c) A un imprecisato eccesso di risposta; d) A tutte e tre le condizioni; e) A nessuna di queste condizioni.

14. Molti degli studi clinici sugli estratti batterici nella prevenzione delle RRI sono di qualità metodologica mediocre

Vero/Falso

15. L'impiego del cortisone è efficace:

a) Nelle PFAPA; b) Nelle tonsilliti da adenovirus; c) Nelle tonsilliti streptococciche; d) In nessuna di queste; e) In tutte queste.

Risposte

PAGINA GIALLA 1=a; 2=c, 3 Falso; LETTERE 4=Vero; 5=c; FIBROSI CISTICA 6=c; 7=c; 8=d, 9=a; FITOTERAPIA 10=a; 11=b; ABC 12=a; 13=c; 14=Vero; 15=e.