

## MeB – Pagine Elettroniche

Volume XX

Gennaio 2017

numero 1

### I POSTER DEGLI SPECIALIZZANDI

#### VOMITO GRECO

Martina Gori<sup>1</sup>, Gianluigi Laccetta<sup>1</sup>, Teresa Di Chio<sup>1</sup>,  
Mariagrazia Esposito<sup>1</sup>, Alice Bonuccelli<sup>2</sup>, Giuseppe Maggiore<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Gastroenterologia Pediatrica; <sup>2</sup>Neuropediatria

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Pisa, Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana  
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di Pisa

**Indirizzo per corrispondenza:** [marti.gori@gmail.com](mailto:marti.gori@gmail.com)

Luca, 3 anni, dall'età di un mese presenta episodi caratterizzati da malessere generale, pallore, sudorazione algida, epigastralgia e vomito. Gli episodi hanno una frequenza di circa 2-3 all'anno; non si verificano mai nel sonno, ma più frequentemente nella tarda mattinata. Vengono inizialmente diagnosticati come malattia da reflusso gastroesofageo.

Quando giunge alla nostra osservazione Luca è in terapia con ondansetron al bisogno, con beneficio. L'esame obiettivo risulta nella norma. Viene eseguito un EEG che

mostra nel sonno potenziali ampi aguzzi e talora onde ampie per lo più in brevi sequenze in regioni frontocentrotemporali. Sulla base del quadro clinico ed EEG gli episodi sembrano compatibili con la **sindrome di Panayiotopoulos** (SP). La storia di Luca è molto interessante soprattutto per la precoce insorgenza della SP. L'età tipica di esordio è di solito, infatti, dai 3-6 anni; questo ha sicuramente influito a ritardare la diagnosi di una condizione già spesso confusa con altri quadri non epilettici dell'età pediatrica.